

QUE FAIRE AU JARDIN EN AOÛT ?

Les arbres, arbustes et arbrisseaux

- Taillez les arbustes à floraison printanière mais c'est la dernière ligne droite.

- Taillez les arbustes à feuilles (troène, charmille...). C'est en principe une taille de rectification ; la dernière a été faite en juin.

- Faites une taille de floraison des rosiers jusqu'en septembre. Les rosiers refleurissent si la taille des branches déflurées est faite en continu.

Tous les types de rosiers sont concernés comme les fameux rosiers couvre-sol qui sont faciles d'entretien.

- Ne faites rien sur les arbustes à floraison estivale car leur taille sera prévue d'octobre à mars prochains.



HORTENSIA

- Valorisez les déchets de taille. Les déchets d'élagage des arbres ou de taille des arbustes sont déchiquetés ou broyés, puis servent comme paillis ou deviennent du BRF (Bois Raméal Fragmenté).



Infos du mois : le Bois Raméal Fragmenté (BRF)

Un broyage spécifique de branches de feuillus d'un diamètre inférieur à 7 cm correspond au fameux BRF (Bois Raméal Fragmenté).

L'épaisseur du broyat est inférieure à 4 mm. La part des résineux peut cependant représenter 10 à 20%.

La « fraîcheur » est importante : les branches taillées sont broyées dans la semaine et l'épandage doit être fait le jour qui suit.

Le BRF peut être laissé en surface ou incorporé à la griffe dans les premiers cm du sol. Il faut compter 30 litres par m².

La période idéale est d'août à octobre car le sol est encore chaud et « très vivant » pour lancer la décomposition du broyat.

La technique du BRF est très efficace pour (re)constituer les stocks d'humus du sol. Une faim d'azote est souvent à craindre l'année qui suit.



BROYAGE DE DÉCHETS DE TAILLE

Le besoin de BRF ne doit pas justifier l'élimination ou le massacre de haies, véritables refuges d'une biodiversité auxiliaire du jardinier !

Arbres fruitiers et petits fruits

- Taillez en vert les arbres fruitiers ayant produit (cerisiers, certains pruniers) ou qui vont produire (pommiers, poiriers...). Pour les pêcheurs, attendre mars prochain.

- Taillez les cannes des variétés de framboisiers non remontantes qui sont souvent complètement desséchées. Les nouvelles cannes de l'année des variétés remontantes produisent depuis mi juillet et produiront jusqu'en novembre en fonction des espèces.

- Taillez les pieds de casseilles, de cassis ou de groseilles conduits en touffe. Les branches sèches sont coupées à ras. Les branches doubles sont simplifiées.

La taille des jeunes rameaux en surnombre (bois clair) seront coupés en novembre prochain car ils peuvent être bouturés pour multiplier les différentes espèces.



- Pour les ronces, attachez leurs nouveaux rameaux très vigoureux pour ne pas les blesser lors des cueillettes ou des passages de la tondeuse.

- Repiquez les stolons bien formés des fraisiers tous les 30 cm. Auparavant, préparez les plates- bandes de fraisiers. Ameublissez le sol sur 30 cm en apportant du compost mûr ou du terreau. Déposez un paillis de 1 cm d'aiguilles de pins ou de sapins.

- Pour améliorer la production de l'espace de petits fruits, complétez les paillis de déchets verts du moments (tonte, broyat de taille, plantes indésirables...). Pour les fraisiers, les paillis constitués d'aiguilles de pin ou de sapin limitent la voracité des limaces et des escargots.

Quelques conseils pour protéger le verger et les petits fruits !

- Enlevez les fruits non-cueillis des cerisiers ou des pruniers et ceci par cueillette ou secouage des branches. Ces fruits momifiés laissés sur l'arbre sont sources de maladies pour l'année prochaine.

- Posez des bandes engluées autour des troncs pour stopper la montée des cheimatobies femelles (papillons non ailés). Fécondées par les mâles ailés, elles pondent à proximité des bourgeons. Au printemps suivant, les chenilles dévoreront les jeunes feuilles.



PAPILLON MÂLE DE OPEROPHTERA BRUMATA (CHEIMATOBIE OU PHALÈNE BRUMEUSE) - (BEN SALE / FLICKR.COM)

- Contre les vers des fruits (carpocapses) des pommiers, poiriers ou pruniers, enroulez des cartons ondulés autour des troncs pour inciter les larves descendantes à y former leurs cocons. Ils seront brûlés en novembre.



CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES


Pour en savoir + sur la taille et la plantation des arbres fruitiers et des petits fruits : ["Dossier plantation et taille des arbres fruitiers et des petits fruits" sur la page du Club.](#)

Au potager

Comme cela vous était présenté depuis plusieurs années par Eric CHARTON, nous vous proposons d'organiser votre potager en 4 grands espaces thématiques. Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique, tout en alliant le compagnonnage entre les différentes espèces cultivées.

- **L'espace "Ratatouille"** : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, piments, plantes aromatiques, ail, oignons et échalotes.
- **L'espace "Potée"** : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, choux, concombres, cornichons, crosnes et topinambours pour donner du volume.
- **L'espace "Plat gros volumes"** : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits pois nains et à rames et fèves.
- **L'espace "Soupe de courges"** : toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
- Les salades, les radis, les blettes, les betteraves de différentes couleurs ou les navets ... occupent les parties libres ou libérées des différents espaces.

Chaque année, vous déplacerez chacune de vos planches sur la planche suivante de gauche à droite : par exemple, l'espace "Plats gros volumes" prendra la place de l'espace "Ratatouille" en année N+1 etc.



PLAN D'IMPLANTATION DU POTAGER - ERIC CHARTON

Espace "Plats gros volumes"

- Récoltez les pommes de terre tout le mois d'août sans attendre obligatoirement le total dessèchement des pieds.

Ces légumes sont rentrés secs et en l'absence de toute lumière. Humides, ils pourrissent rapidement. A la lumière, ils verdissent et sont impropres à la consommation.



Laissées en terre, les pommes de terre se conservent mieux. Toutefois, les pieds peuvent "patater" en refaisant de nouvelles petites pommes de terre qui affaiblissent la première production. De plus, en cas de fortes attaques de mildiou dues à de fortes pluies, le champignon peut pénétrer dans le sol et progresser vers les tubercules, les contaminer et engendrer des pourritures brunes, notamment au cours de la conservation.

Traditionnellement, les variétés de pommes de terres sont jaunes. Nombreux sont les jardiniers à opter pour des variétés roses ou violettes. Après la récolte des pommes de terre, repiquez les salades.

- Ne semez plus de haricots à rame.

- Semez les haricots nains pour la dernière fois. Ils lèvent rapidement car le sol est chaud et humide. Buttez les haricots après l'arrivée des premières vraies feuilles.

Après la dernière récolte, les fanes sont cisailées sur place et les racines sont laissées en terre.

Après quelques jours, repiquez laitues et chicorées, ou semez mâche ou radis d'hiver.



HARICOTS NAINS - CRISTINA.SANVITO / FLICKR.COM

- Pour occuper les plates-bandes vides, repiquez les salades tous les 30 cm et dans un sol bien décompacté. N'oubliez pas de semer les salades (chicorées et laitues) en pépinière pour un repiquage ultérieur.

Espace "Ratatouille"

- Récoltez début août l'ail, l'oignon ou l'échalote. Une fois arrachés, les plants sont laissés sur place pour les faire sécher. Ils sont ensuite déposés dans des cageots ou tressés, et enfin remis au sec.

Éliminez les bulbes pourris et consommez en premier les blessés.

L'espace étant libéré, repiquez des salades (chicorées ou laitues d'automne) ou semez des radis d'hiver ou des navets.



- Si vos pieds de tomate présentent des signes de mildiou, arrachez les pieds aux tiges noires. Sur ceux moins atteints, éliminez les feuilles malades puis faites une pulvérisation avec du bicarbonate de soude.



NECROSES NOIRATRES DUES AU MILDIOU SUR TOMATE

Les pieds de tomate arrachés sont remplacés par des choux-raves, brocolis, chou-kale. La place libérée sous tonnelle ou tunnel est semée de betteraves rouges ou de carottes grelot (pousse très rapide) et surtout sera plantée de salades d'hivers.

- Tuteurez les pieds d'aubergine qui ont beaucoup de feuilles et un retard dans la fructification, et les pieds de poivron ou de piment qui se développent très bien.

- Supprimez les feuilles malades ou jaunies des pieds courgettes. Les productions sont importantes.



Quelques conseils pour protéger l'espace "Ratatouille" !

- Pour prévenir l'attaque des maladies, pulvérisez ces légumes-fruits avec une décoction de prêle (dilution à 20%), ou d'extraits fermentés de consoude ou d'ortie (dilution à 5 %). Ces derniers peuvent être versés à l'arrosoir aux pieds des plantes (dilution à 20%).

- Pulvériser les pieds de tomate peu affectés par le mildiou avec du bicarbonate de soude (5 g par litre d'eau + savon noir) bloque cette maladie.

Attention, son pouvoir asséchant peut affecter les fleurs ; il faut les protéger avec un carton lors de la pulvérisation.

Espace "Potée"

- Repiquez pour l'hiver des choux à fleurs (chou-fleur, brocoli, romanesco), à feuilles (kale, palmier...) et les choux de Bruxelles et ceci tous les 50/60 cm en tout sens.

Repiquez les choux-raves ou les choux-navets tous les 30 cm. Ils doivent pousser rapidement pour éviter "de manger du bois".

- Eclaircissez les carottes à 5/10 cm et les panais à 15/20 cm. Ces légumes-racines sont récoltés à besoin.

- Repiquez les poireaux jusqu'au 15 août en fonction des variétés (Bleu de Solaise, de Carentan, Monstrueux d'Elbeuf...). Repiquez des plants de la grosseur d'un crayon. "Habillez-les" en coupant la moitié des racines et un tiers des feuilles. Pour avoir des fûts blancs plus longs, les poireaux sont enfoncés profondément grâce à un plantoir. Plusieurs semaines après, ils seront buttés et paillés. Complétez les paillis des plantations précédentes.



- Enrichissez de compost le sol des céleris-raves ou des céleris à branches puis paillez. Les feuilles des céleris les plus vieilles, souvent plus jaunes et à plat, sont enlevées et déposées sur ou entre les rangs.

- Semez des betteraves rouges (Crapaudine, Noire d'Egypte...) début août et des navets (Navet blanc, boule d'or...) tout le mois d'août ou repiquez des laitues d'automne. Les betteraves peuvent être semées en godets ou en plaque de semis. Ces semis ou plantation permettent d'occuper les places libres ou libérées de l'espace "Potée".

- Taillez les concombres (ou pas).

Quelques conseils pour protéger l'espace "Potée" !

- Pour limiter les attaques de champignons, pulvérisez avec une décoction de prêle les concombres, poireaux, carottes, panais ou céleris.

- Pour éviter la teigne ou la mouche du poireau, ou la mouche de la carotte, mettez un filet anti-insectes.

- Si les choux sont fortement attaqués par les limaces en raison des pluies fréquentes, prévoyez des techniques simples (cendre de bois, aiguilles de pin ou de sapin) ou produits anti-limaces autorisés en agriculture biologique.

Espace "Soupe de courges"

- Pincez les rameaux des courges coureuses de la 3ème à la 5ème feuille qui suit un fruit. Les différentes espèces de courges (butternut, citrouille, longue de Nice, melon, potiron...) se développent très bien en tous sens grâce aux conditions climatiques.



Quelques conseils pour protéger cet espace !

- En période très chaude, les feuilles des courges sont sensibles au blanc (oïdium). Prévenez ces attaques en pulvérisant toutes les semaines et le soir avec un mélange d'eau et de lait (ou petit-lait).



OÏDIUM SUR COURGE - JARDINER MALIN.FR

Astuce du mois - La merveilleuse décoction de prêle !

Connaissez-vous la prêle des champs ?

Certains diront "Oh quelle terrible mauvaise herbe !"

D'autres, au contraire, vanteront ses mérites. Outre ses vertus reminéralisantes pour lesquelles on l'utilise en phytothérapie, la prêle présente aussi de nombreux atouts pour le jardinier.

En effet, très riche en minéraux et oligo-éléments, notamment en silice, la prêle est excellente en prévention des maladies du potager.

Utilisée essentiellement en décoction et pulvérisée sur le feuillage, la silice qu'elle contient va pénétrer via les stomates des feuilles et renforcer l'épiderme de vos plantes. Celui-ci sera donc plus résistant face aux attaques de maladies, voire même de ravageurs.

Arbres, arbustes, végétaux d'ornement ou potagers, tous peuvent en bénéficier.



PRÊLE DES CHAMPS